

Julho 2016

**LISTAGEM VACINAS ANTIRÁBICAS AUTORIZADAS PARA CÃES, GATOS E FURÕES**

NOME	TITULAR AIM	DURAÇÃO DA IMUNIDADE	PROTOCOLO VACINAL
Eurican CHP-LR liofilizado e solvente para suspensão injectável (ex HEXADOG)	MERIAL Portuguesa – Saúde Animal, Lda.	<b>Cães:</b> 1 ano	<b>Primovacinação:</b> Uma injeção da vacina a partir dos 3 meses de idade.  <b>Revacinação:</b> Anual.
Eurican CHPPi2-LR	MERIAL Portuguesa – Saúde Animal, Lda.	<b>Cães:</b> 1 ano	<b>Primovacinação:</b> Uma injeção da vacina a partir das 12 semanas de idade.  <b>Revacinação:</b> Anual.
Nobivac Rabies, suspensão injectável destinada a cães, gatos, bovinos e equinos	MSD Animal Health, Lda.	<b>Cães e gatos:</b> 3 anos	<b>Primovacinação:</b> Aos 3 meses de idade.  <b>Revacinação:</b> 3 anos.
Purevax Rabies suspensão injectável (Vacina para Gatos)	MERIAL	<b>Gatos:</b> 1 ano após a primovacinação; depois em intervalos de 3 anos.	<b>Primovacinação:</b> Às 12 semanas de idade.  <b>Revacinação:</b> 1 ano após a primovacinação e depois em intervalos de 3 anos.

Julho 2016

**LISTAGEM VACINAS ANTIRÁBICAS AUTORIZADAS PARA CÃES, GATOS E FURÕES**

NOME	TITULAR AIM	DURAÇÃO DA IMUNIDADE	PROTOCOLO VACINAL
Rabdomun suspensão injetável para cães, gatos, bovinos e equinos	ZOETIS PORTUGAL, LDA.	<b>Cães e Gatos:</b> 3 anos	<b>Primovacinação:</b> Administrar 1 ml por via subcutânea, a partir dos 3 meses de idade. Os cães e gatos inoculados antes das doze semanas de idade devem ser revacinados nessa altura, ou o mais próximo possível.  <b>Revacinação:</b> - Cães: recomenda-se uma revacinação de 3 em 3 anos. - Gatos: recomenda-se uma revacinação de 2 em 2 anos.
RABIGEN MONO Solução injetável para cães e gatos	VIRBAC de PORTUGAL LABORATÓRIOS	<b>Cães e Gatos:</b> 1 ano	<b>Primovacinação:</b> Uma única administração a partir dos 3 meses.  <b>Revacinação:</b> Anual.
RABISIN Suspensão injetável	MERIAL PORTUGUESA - SAÚDE ANIMAL, LDA	<b>Cães e gatos:</b> 1 ano após a primovacinação e depois em intervalos até 3 anos.	<b>Primovacinação:</b> A partir das 12 semanas de idade.  <b>Revacinação:</b> 1 ano após a primovacinação e depois em intervalos até 3 anos.

Julho 2016

**LISTAGEM VACINAS ANTIRÁBICAS AUTORIZADAS PARA CÃES, GATOS E FURÕES**

NOME	TITULAR AIM	DURAÇÃO DA IMUNIDADE	PROTOCOLO VACINAL
Vacina Antirrábica, suspensão injetável para cães, gatos e bovinos	MEDINFAR-SOROLÓGICO – PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, S.A.	<b>Cães e Gatos:</b>  1 ano	<b>Primovacinação:</b> Administrar uma dose de vacina a partir da 12ª semana de vida.  <b>Revacinação:</b> Anual.
Versican DHPPi/L3R, liofilizado e solvente para suspensão injetável para cães	ZOETIS PORTUGAL, LDA.	<b>Cães:</b>  1 ano	<b>Primovacinação:</b> A eficácia da valência contra a raiva foi comprovada após uma dose única a partir das 12 semanas de idade.  <b>Revacinação:</b> Anual.
Versican Plus DHPPi/L4R, liofilizado e solvente para suspensão injetável para cães	Zoetis Belgium SA	<b>Cães:</b>  3 anos	<b>Primovacinação:</b> A eficácia da valência contra a raiva foi comprovada em estudos laboratoriais após uma dose única a partir das 12 semanas de idade. Assim, a primeira dose pode ser administrada com a Versican Plus DHPPi/L4. Nesse caso, a segunda dose com a Versican Plus DHPPi/L4R não deve ser administrada antes das 12 semanas de idade. No entanto, em estudos de campo, 10% dos cães seronegativos não fizeram seroconversão (> 0,1 UI/ml) 3-4 semanas após vacinação primária única contra a raiva. Alguns animais podem também não apresentar um título de anticorpos > 0,5 UI/ml após primovacinação única. O título de anticorpos diminui ao longo dos 3 anos de duração de imunidade, embora os cães estejam protegidos se infetados. No caso dos animais viajarem para áreas de risco ou para fora dos países da UE, o médico veterinário pode optar por administrar vacinação anti-rábica adicional após as 12 semanas para assegurar que os animais vacinados têm um título de anticorpos ≥ 0,5 UI/ml, que é normalmente considerado como suficientemente protetor e assim cumprir os requisitos para os animais viajarem (título de anticorpos ≥ 0,5 UI/ml).

Julho 2016

### LISTAGEM VACINAS ANTIRÁBICAS AUTORIZADAS PARA CÃES, GATOS E FURÕES

NOME	TITULAR AIM	DURAÇÃO DA IMUNIDADE	PROTOCOLO VACINAL
			<p>Em caso de necessidade, cães com idade inferior a 8 semanas podem ser vacinados, uma vez que a segurança deste medicamento veterinário foi demonstrada em cães com 6 semanas de idade.</p> <p><b>Revacinação:</b> Recomenda-se uma revacinação de 3 em 3 anos.</p>
Versican Plus Pi/L4R, liofilizado e solvente para suspensão injetável para cães	Zoetis Belgium SA	<p><b>Cães:</b></p> <p>1 ano</p>	<p><b>Primovacinação:</b> Duas doses Versican Plus Pi/L4R com intervalo de 3-4 semanas, a partir das 8-9 semanas de idade. A segunda dose não deve ser administrada antes das 12 semanas de idade.</p> <p>A eficácia da valência contra a raiva foi comprovada em estudos laboratoriais após uma dose única a partir das 12 semanas de idade. Assim, a primeira dose pode ser administrada com a Versican Plus Pi/L4. Nesse caso, a segunda dose com a Versican Plus Pi/L4R não deve ser administrada antes das 12 semanas de idade. No entanto, em estudos de campo, 10% dos cães seronegativos não demonstraram seroconversão (&gt; 0,1 UI/ml) 3-4 semanas após uma administração primária única contra a raiva. Outros 17% não apresentaram um título de anticorpos contra a raiva de 0,5 UI/ml, que é requerido por alguns países fora da UE para a entrada de animais. No caso dos animais viajarem para áreas de risco ou para fora dos países da UE, o médico veterinário pode optar por efetuar a primovacinação com duas doses que incluam a raiva, ou pode administrar uma vacinação anti-rábica adicional após as 12 semanas. Em caso de necessidade, cães com idade inferior a 8 semanas podem ser vacinados uma vez que a segurança deste medicamento veterinário foi demonstrada em cães com 6 semanas de idade.</p> <p><b>Revacinação:</b> Anual.</p>

Julho 2016

## LISTAGEM VACINAS ANTIRÁBICAS AUTORIZADAS PARA CÃES, GATOS E FURÕES

NOME	TITULAR AIM	DURAÇÃO DA IMUNIDADE	PROTOCOLO VACINAL
Vanguard R	ZOETIS PORTUGAL, LDA.	<b>Cães, Gatos e Furões:</b>  1 ano após a primovacinação; depois em intervalos de 2 anos.	<b>Primovacinação:</b> A partir das 12 semanas de idade. A primovacinação é com uma dose única da vacina.  <b>Revacinação:</b> 1 ano após a primovacinação; depois em intervalos de 2 anos.